

# SERRAVES

---

*Brachychiton populneus* (Schott & Endl.) R.Br.

## 10 Exemplos no Parque



**Família**

Malvaceae

## Nome Comum

braquiquito, braquiquiton, perna-de-moça

## Origem

Oceânia (Austrália).

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

(Schott & Endl.) R.Br.

## Descrição

O braquiquito é uma [árvore sempre-verde](#) com até 12 m de altura, com [copa](#) densa e [piramidal](#). O seu [tronco](#) é reto, geralmente com a [casca](#) lisa e [verde](#), fissurada. Os ramos exteriores são pendentes. As folhas são alternas, de 6 a 8 cm de comprimento, com longos pecíolos, de cor [verde-escuro](#) e de forma variável. As folhas adultas são ovadas, com o [ápice](#) muito pronunciado e nervuras bem marcadas, por vezes têm 3 a 5 lóbulos. As flores são numerosas, campanuladas, com 1 cm de diâmetro de cor branco-amarelado e com pontos roxos no interior, dispostas em inflorescências terminais formando panículas subterminais. O fruto é uma [cápsula](#) lenhosa [deiscente \(folículo\)](#), com cerca de 7 cm de comprimento e de cor negra na [maturação](#). As sementes são amarelas e estão cobertas de pêlos irritantes ao tacto.

## Tipo de Reprodução

[monóica](#)

## Forma de Vida

[árvore](#)

## Início de Floração

maio

## Fim de Floração

julho

## Tipo de Fruto

[folículo](#)

## Consistência do Fruto

seco

## **Maturação do Fruto**

novembro

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

## **Cor da Flor**

branco

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## **Habitat**

Surge desde as zonas costeiras mais húmidas até ao interior semiárido da Austrália.

## Observações

o nome do género *Brachychiton*, provém do grego *brachys* = curto e *chiton* = tónica, provavelmente devido à pilosidade curta e densa que cobre as sementes. O nome *populneus*, é alusivo às folhas que se assemelham com as do choupo (*Populus*).

O braquiquito é muito resistente à falta de água e por isso utilizado na Austrália como forragem em períodos de seca.

Multiplica-se por sementes. Os seus frutos colhem-se da [árvore](#) maduros (quando estão com a cor negra e abertos), desprendendo-se as sementes com facilidade. A [taxa](#) de germinação é alta e não necessita de tratamentos prévios. É uma [árvore](#) de rápido crescimento, de solos com humidade média, e é resistente à poluição urbana. Pode [cultivar-se](#) isolado, em agrupamentos ou alinhamentos.

## Aplicações

É uma [árvore](#) utilizada em jardins, parques e em plantações urbanas. É uma [espécie](#) recomendada também para reflorestações no seu país de origem, onde a [casca](#) já serviu como fibra vegetal para confeccionar cordas e até para vestuário dos indígenas. Além disso, as folhas são utilizadas como alimento para o gado ruminante.

## Porte



Folha



## Tronco

