

SERRAVES

Elaeagnus pungens Thunb.

26 Exemplares no Parque



Família

Elaeagnaceae

Nome Comum

oliveira-do-paráiso, oliveira-espinhosa, oliveira-do-paráiso-espinhosa

Origem

Ásia (China e Japão).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

Thunb.

Descrição

Elaeagnus pungens é um [arbusto](#) que pode atingir os 5 m de altura, de crescimento lento, forma ovóide e [folhagem](#) densa, ramos castanhos e espinhosos. As folhas são persistentes, alternas, [simples](#), inteiras, ovais ou oblongas, coriáceas, de margem ondulada e [pecíolo](#) castanho; medem cerca de 5 a 10 cm de comprimento, são acuminadas ou obtusas, de base arredondada, [verde-acinzentadas](#) na [página](#) superior; prateado na [página](#) inferior, com escamas avermelhadas. As flores são branco-prateadas, com cerca de 1,5 cm de comprimento, reunidas em grupos de 3 ou solitárias, pedunculadas e odoríferas. Os frutos são drupáceos, elipsóides, com 1,5 cm de comprimento de cor vermelho brilhante.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

outubro

Fim de Floração

novembro

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[carnudo](#)

Maturação do Fruto

abril

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

ondulada

(com uma zona marginal mais ou menos larga, alternadamente subindo e descendo, segundo curvas arredondadas.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

No seu local de origem esta [espécie](#) ocorre em encostas e [matagais](#).

Observações

Existem algumas cultivares que diferem essencialmente pela tonalidade das folhas: 'Aurea', de folhas com a margem amarelo intenso; 'Simonii', de folhas maiores e prateadas, quase sem escamas, menos rústico; 'Variegata' de folhas com a margem branca amarelada.

Foi introduzida nos EUA por volta de 1830, onde tem sido bastante difundida como [ornamental](#), estando em alguns locais com comportamento invasor.

Aplicações

Elaeagnus pungens é um [arbusto](#) utilizado como [ornamental](#), muito resistente ao vento, sendo por isso muito utilizado para formar sebes que servem de barreira.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

