

SERRAVES

Prunus domestica L.

5 Exemplares no Parque



Família

Rosaceae

Nome Comum

ameixeira, ameixoeira, ameixieira

Origem

Sudeste da Europa (Cáucaso) e sudoeste da Ásia.

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

L.

Descrição

A [espécie](#) *Prunus domestica* é uma [árvore](#) de até 10 m de altura. As cultivares possuem os ramos subfastigiados e inermes, as plantas silvestres frequentemente são um tanto espinhosas, muitas vezes com rebentos na raiz. Os raminhos cinzento-acastanhados, possuem folhas pediceladas, [oblongo-lanceoladas](#), densamente pubescentes a subglabras na [página](#) inferior. As flores possuem pétalas brancas. O fruto é uma [drupa](#) globosa a oblonga, purpúrea, vermelha, amarela ou [verde](#), doce ou ácida, não [adstringente](#); [endocarpo](#) um tanto rugoso.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Início de Floração

março

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[carnudo](#)

Maturação do Fruto

agosto

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

solitária

(diz-se de uma flor que está isolada, na axila da folha ou na extremidade do caule.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

Limbo da Folha

oblongo-lanceolado

(limbo largamente lanceolado.)

Habitat

Rara no estado silvestre. Ocorre em terrenos abertos e solos húmidos, sendo cultivada por toda a Europa.

Observações

É, muito provavelmente, um híbrido derivado do abrunheiro-bravo, *Prunus spinosa*, e do *Prunus cerasifera*, que crescem conjuntamente no Sudeste Europeu e na Ásia Ocidental. A ameixeira é cultivada desde tempos remotos no Médio Oriente. Dela deriva o abrunheiro, *Prunus insititia*, com frutos bastante pequenos, globosos, geralmente de cor azul-escura ou púrpura.

Aplicações

A “amêndoa” dos caroços da ameixeira, contém ácido cianídrico, que pode ser perigoso. A ameixa fresca contém 84% de água, entre 8 a 11% de glúcidos, 1,5% de ácidos orgânicos, uma quantidade notável de provitamina A, os minerais clássicos e um pigmento. A ameixa seca, tem uma percentagem de glúcidos de cerca de 60%, dos quais 44% são açúcares, tornando-se assim um alimento de elevado valor energético, tónico e depurativo e um [laxante](#) de fama milenar.

Porte



Folha



Tronco

