

*Lantana camara* L.

## 7 Exemplos no Parque



**Família**

Verbenaceae

## Nome Comum

lantana, camará, cambará, lanatana-espinhosa, camará-miúdo, camará-verdadeiro, [camará-de-espinho](#), camará-de-chumbo, cambará-de-cheiro, cambarazinho

## Origem

América Tropical: América do Norte (México) e América do Sul

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

L.

## Descrição

*Lantana camara* é um [arbusto](#) muito ramificado, sempreverde, de 30 cm a 2(3) m ou um pouco mais de altura. Possui um aroma muito penetrante e característico, semelhante ao da [erva-cidreira](#). Possui os ramos quadrangulares, castanho-claros, providos de pequenos espinhos. Folhas opostas, muito grossas, rugosas, ovadas ou cordiformes, de margem serrada, aromáticas. Inflorescências em capítulos corimbiformes, de flores sésseis, pequenas, variegadas de amarelo, rosa, roxo ou alaranjadas, outras vezes todas amarelas, ou brancas, as externas de cor azulada. O [cálice](#) é muito pequeno, com dois lóbulos; a [corola tubular](#), com o tubo algo curvado e [limbo](#) com 4-5 lóbulos desiguais; 4 estames, dois deles mais curtos (didinâmicos), ocultos pela [corola](#), e [ovário](#) súpero. Os frutos são carnudos, drupáceos, com dois caroços, no início verdes e no fim da [maturação](#) escuros.

## Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

## Forma de Vida

[arbusto](#)

## Início de Floração

julho

## Fim de Floração

setembro

## Tipo de Fruto

[drupa](#)

## **Consistência do Fruto**

[camudo](#)

## **Maturação do Fruto**

setembro

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

capítulo

(inflorescência indefinida, globosa ou achatada no cimo, de flores geralmente sésseis, reunidas numa dilatação do pedúnculo chamado receptáculo e rodeada, em regra, por um involúcro de brácteas que podem ser unisseriadas, bisseriadas ou imbricadas.)

## **Cor da Flor**

vermelho

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## **Margem da Folha**

serrada

(com dentes marginais agudos e próximos, como os de uma serra, dirigidos para o ápice da folha.)

## **Limbo da Folha**

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

## **Habitat**

Apresenta uma ampla tolerância ecológica, ocorrendo em diversos habitats e sobre uma variedade de tipos de solos, contudo prefere zonas abertas, como orlas de florestas tropicais e terrenos baldios.

## Observações

Cultiva-se com muita frequência no Este e Sul da Península. Existem inúmeras cultivares que se diferenciam pela tonalidades das flores. Entre elas destacam-se: 'Feston rose' com flores amarelo e rosa, a 'Mine d'or' com flores totalmente amarelas, a 'Snow white' com flores totalmente brancas, a 'Tangerine' com flores amarelo e laranja e a 'Tricolor', que apresenta flores amarelas, laranjas e rosas.

## Aplicações

É considerada uma planta venenosa, sobretudo as folhas e frutos, que contêm um triterpeno pentacíclico (lantanina ou lantadeno A), produzindo fotossensibilização nos animais e colapso neurocirculatório.

## Porte



## Folha



**Flor**



**Fruto**





## Tronco

