# **SERRAYES**

Viburnum tinus L.

### **591 Exemplares no Parque**



### Família

Viburnaceae

#### **Nome Comum**

folhado, laurestim, folhado-comum, milfolhado

#### **Origem**

Europa (Região Mediterrânica e Macaronésia).

#### **Tipo de Origem**

autóctone

#### **Autor**

L.

#### Descrição

Arbusto sempre-verde, raramente ultrapassando os 6 m de altura, com ramos angulosos. Possui uma folhagem muito densa, constituída por folhas simples, inteiras, curtamente pecioladas, oposto-cruzada, sem estípulas. Limbo de contorno ovado-oblongo ou lanceolado, com a margem inteira, de cerca de 10 cm de comprimento, verde-escuro, sendo mais claro na página inferior. As flores reunidas em cimeiras corimbiformes, bastante amplas e quase planas, até 10 cm de diâmetro, no ápice dos ramos. São hermafroditas e possuem uma corola curta, campanulada, com 5 lóbulos brancos, por vezes corados de rosa, principalmente início da floração. Apresentam 5 estames curtos, que alternam com as pétalas e um ovário com estilete curto e estigma trilobulado. O fruto é uma drupa, não comestível, ovoide, com 5 a 8 mm de comprimento, de cor azul metálico quando maduro, carnudo, com uma semente.

#### Tipo de Reprodução

hermafrodita

#### Forma de Vida

arbusto

Ínicio de Floração

janeiro

Fim de Floração

março

**Tipo de Fruto** 

drupa

#### Consistência do Fruto

carnudo

#### Maturação do Fruto

setembro

#### **Perenidade**

perenifólia

#### Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

#### Cor da Flor

branco

#### Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

#### Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

#### Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

#### Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

#### **Habitat**

Ocorre naturalmente em <u>matagais</u>, bosques perenifólios e em galerias ripícolas.

#### Observações

O epíteto específico, *tinus*, significa "louro silvestre", tendo sido aplicado por Plinio, e posteriormente por Clusio, pelo facto da <u>folha</u> ser parecida com a do loureiro. O folhado é <u>cultivado</u> frequentemente como <u>ornamental</u>, exigindo poucos cuidados. Tem flores e frutos muito duradouros, e a <u>folhagem</u> é <u>sempre-verde</u> e muito decorativa. Reproduz-se facilmente por <u>semente</u>. Existem várias cultivares, como por exemplo, a "*Strictum*" que tem <u>porte</u> erecto, cónico, e a "*Variegatum*", com as folhas variegadas de amarelo ou creme e flores rosadas.

Está protegido por lei nas Baleares (relacionado com fins comerciais).

### **Aplicações**

Os frutos do folhado já foram utilizados como purgante, e para combater a hidropisia (acumulação de líquido seroso numa cavidade), contudo actualmente não é aconselhável o seu uso, pois podem provocar inflamações na boca, sendo os seus efeitos pouco conhecidos. As folhas esmagadas terão sido utilizadas como <u>febrífugo</u>.

#### **Porte**





# Folha



# Flor



## Fruto



## Tronco

