

SERRAVES

Viburnum tinus L.

591 Exemplares no Parque



Família

Viburnaceae

Nome Comum

folhado, laurestim, folhado-comum, milfolhado

Origem

Europa (Região Mediterrânica e Macaronésia).

Tipo de Origem

[autóctone](#)

Autor

L.

Descrição

[Arbusto sempre-verde](#), raramente ultrapassando os 6 m de altura, com ramos angulosos. Possui uma [folhagem](#) muito densa, constituída por folhas [simples](#), inteiras, curtamente pecioladas, [oposto-cruzada](#), sem estípulas. [Limbo](#) de contorno [ovado-oblongo](#) ou [lanceolado](#), com a margem inteira, de cerca de 10 cm de comprimento, [verde-escuro](#), sendo mais claro na [página](#) inferior. As flores reunidas em cimeiras corimbiformes, bastante amplas e quase planas, até 10 cm de diâmetro, no [ápice](#) dos ramos. São hermafroditas e possuem uma [corola](#) curta, campanulada, com 5 lóbulos brancos, por vezes corados de rosa, principalmente início da [floração](#). Apresentam 5 estames curtos, que alternam com as pétalas e um [ovário](#) com [estilete](#) curto e [estigma](#) trilobulado. O fruto é uma [drupa](#), não comestível, [ovoide](#), com 5 a 8 mm de comprimento, de cor azul metálico quando [maduro, carnudo](#), com uma [semente](#).

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

janeiro

Fim de Floração

março

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

ovado

(contorno semelhante ao corte longitudinal dum ovo.)

Habitat

Ocorre naturalmente em [matagais](#), bosques perenifólios e em galerias ripícolas.

Observações

O epíteto específico, *tinus*, significa “louro silvestre”, tendo sido aplicado por Plínio, e posteriormente por Clusio, pelo facto da [folha](#) ser parecida com a do loureiro. O folhado é [cultivado](#) frequentemente como [ornamental](#), exigindo poucos cuidados. Tem flores e frutos muito duradouros, e a [folhagem](#) é [sempre-verde](#) e muito decorativa. Reproduz-se facilmente por [semente](#). Existem várias cultivares, como por exemplo, a “*Strictum*” que tem [porte](#) erecto, cónico, e a “*Variegatum*”, com as folhas variegadas de amarelo ou creme e flores rosadas.

Está protegido por lei nas Baleares (relacionado com fins comerciais).

Aplicações

Os frutos do folhado já foram utilizados como purgante, e para combater a hidropisia (acumulação de líquido seroso numa cavidade), contudo actualmente não é aconselhável o seu uso, pois podem provocar inflamações na boca, sendo os seus efeitos pouco conhecidos. As folhas esmagadas terão sido utilizadas como [febrífugo](#).

Porte





Folha



Flor



Fruto



Tronco

