

# SERRAVES

---

*Viburnum opulus* L.

### 3 Exemplares no Parque



### Família

Viburnaceae

## Nome Comum

noveleira, bola-de-neve, rosa de gueldres, novelo, novelo-da-china, novelo-cromático, espirema

## Origem

Grande parte Europa, oeste e norte de Ásia.

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

L.

## Descrição

O noveleiro é um [arbusto](#) silvestre, [caducifólio](#), de 2 a 4 m de altura, com ramos abertos, um pouco pendentes. Folhas palmatilobadas, com 3 a 5 lóbulos, opostas e toscamente dentadas, [página](#) superior [verde-escura](#) e glabra, [página](#) inferior pilosa; com [pecíolo](#) comprido. [Inflorescência](#) tipo [corimbo](#), de 7,5 cm de diâmetro, com flores exteriores maiores que as do centro e estéreis. Os frutos são drupas vermelho-lustrosas, com cerca de 1 cm de diâmetro, não comestíveis. Nos exemplares cultivados, as inflorescências são globosas e de cor branco puro ou rosado, com todas as flores estéreis.

## Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

## Forma de Vida

[arbusto](#)

## Início de Floração

maio

## Fim de Floração

julho

## Tipo de Fruto

[drupa](#)

## Consistência do Fruto

[camudo](#)

## **Maturação do Fruto**

agosto

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

## **Cor da Flor**

branco

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## **Margem da Folha**

dentada

(provida de dentes mais ou menos perpendiculares à linha da margem.)

## **Limbo da Folha**

palmatilobado

(com nervação palmada e limbo lobado)

## **Habitat**

Floresta de folhas largas, mistas e húmidas e margem dos cursos de água.

## **Observações**

É uma planta muito apreciada em jardinagem. Está protegido por lei na Andaluzia e em Madrid. Existem cultivares, tais como "Aureum" com folhas jovens que se tornam amarelas, e mais tarde, verdes; "Roseum" com [porte arredondado](#), e folhas roxas no Outono; "*Flore Pleno*", com flores duplas em racimos globosos.

Nos exemplares cultivados, as inflorescências são globosas e de cor branco puro ou rosado, com todas as flores estéreis.

## Aplicações

A água destilada das suas flores é utilizada como diurética. A [casca](#) tem propriedades anti-espasmódicas e diuréticas. Contudo é considerada uma planta tóxica, principalmente os frutos, por conterem um princípio amargo, a *viburnina*.

## Folha



**Flor**

