# **SERRAYES**

Bougainvillea glabra Choisy

# **14 Exemplares no Parque**



# Família

Nyctaginaceae

#### **Nome Comum**

buganvílias, primavera, buganvile, ceboleiro, <u>flor-de-papel</u>, pataguinha, pau-de-roseira, roseiro, <u>roseta,</u> santa-rita, <u>sempre-lustrosa</u>, três-marias

### **Origem**

Nativa da América do Sul, Brasil.

### **Tipo de Origem**

alóctone

#### **Autor**

Choisy

### Descrição

<u>Espécie</u> arbustiva, trepadeira, lenhosa, vigorosa que pode ser conduzida como <u>árvore.</u> <u>Tronco</u> vigoroso, com alguns espinhos, de onde ramificam todos os anos novos rebentos que crescem vigorosamente. Folhas pequenas, <u>simples</u> de margem inteira, dispostas de forma alternada, com <u>pecíolo</u> bem desenvolvido e de forma elíptica, <u>verde-claro</u> e algo <u>lustroso</u> na <u>página</u> superior. As flores são pequenas, brancas, rodeadas de brácteas foliáceas lilases, organizadas em grupos de três. <u>Floração</u> muito abundante, durante praticamente toda a estação quente, que pode cobrir completamente a planta. Os frutos são aquénios de paredes delgadas, <u>indeiscente.</u>

### Tipo de Reprodução

hermafrodita

Forma de Vida

trepadeira

Ínicio de Floração

abril

Fim de Floração

setembro

**Tipo de Fruto** 

aquénio

Consistência do Fruto

seco

#### Maturação do Fruto

outubro

#### **Perenidade**

perenifólia

#### Inflorescência

cimeira

( inflorescência com o eixo principal de crescimento limitado, no prolongamento do pedúnculo, de onde partem eixos secundários, terminando todos numa flor, que variam em número e ramificações, podendo ser uníparas, bíparas ou múltiparas.)

#### Cor da Flor

violeta

### Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

#### Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

#### Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

#### Limbo da Folha

elíptico

(contorno elíptico, de comprimento 2-3 vezes a largura, diminuindo do meio igualmente para os extremos.)

#### Habitat

Floresta caducifólia e <u>semi-caducifólia</u> e floresta ombrófila mista.

### Observações

O maior exemplar conhecido de *Bougainvillea* do mundo está localizado à beira do lago Guanabara no Município de Lambari no Sul de Minas Gerais, conduzido a <u>árvore</u> com 18 m de altura.


## **Aplicações**

Cultivada essencialmente pelas suas flores. Pode ser conduzida a <u>arbusto</u> ou <u>árvore</u> e como trepadeira, enfeitando pérgulas ou qualquer outro suporte.

### **Porte**



# Folha



# Flor



# Tronco

