

# SERRAVES

---

*Ilex aquifolium* L. 'Variegata'

**2 Exemplares no Parque**



**Família**

Aquifoliaceae

## Nome Comum

azevinho-de-folhas-variegadas, zebro, [pica-folha](#), visqueiro

## Origem

Sul e oeste da Europa, norte de África e oeste da Ásia. Na Península Ibérica é especialmente abundante nas regiões setentrionais.

## Tipo de Origem

[autóctone](#)

## Autor

L.

## Descrição

[Espécie sempre-verde](#), dioica, que possui um [porte arbustivo](#) ou [arbóreo](#), podendo atingir 20 m de altura. [Tronco](#) direito com [casca](#) lisa e cinzenta, tornando-se rugosa com a idade. Folhas [simples](#), alternas, lanceoladas ou [ovado-oblongas](#), coriáceas e lustrosas na [página](#) superior, onduladas e de margem espinhosa, por vezes praticamente lisa. Esta [cultivar](#), apresenta folhas bicolors ou variegadas, geralmente [verde](#) e branco ou [verde](#) e creme. As flores são pequenas, até 1 cm de diâmetro, brancas, funcionalmente unissexuais e surgem em pequenos cachos na zona de [inserção](#) das folhas. O fruto é uma [drupa](#) carnuda, esférica até 1 cm de diâmetro e com 4 a 5 sementes, muito atrativo pela sua cor vermelho-vivo.

## Tipo de Reprodução

[dióica](#)

## Forma de Vida

[árvore](#)

## Início de Floração

abril

## Fim de Floração

julho

## Tipo de Fruto

[drupa](#)

## Consistência do Fruto

[carnudo](#)

## **Maturação do Fruto**

outubro

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

cacho

((ou racemo/rácimo), inflorescência grupada de flores providas de pedicelos, que se inserem ao longo de um eixo comum. Se o pedúnculo é simples, o cacho é simples; se ramificado, o cacho é composto.)

## **Cor da Flor**

branco

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

espinhosa

(margem provida de espinhos.)

## **Limbo da Folha**

lanceolado

(em forma de ferro de lança, mais largo no meio e estreitando gradualmente para as extremidades.)

## **Habitat**

A [espécie](#) nativa *Ilex aquifolium*, ocorre espontaneamente em bosques e [matagais](#) húmidos, carvalhais e nas margens de água, bem como em encostas montanhosas ensombradas da sua [área](#) de distribuição, até 1600 m.

## **Observações**

O azevinho, está protegido por Decreto-Lei nº 423/89, de 4 de Dezembro, que proíbe a colheita dos seus ramos e o corte na meio [Natural](#), o que levou a que fosse propagado e manipulado em viveiro para satisfazer a sua grande procura como planta [ornamental](#).

## Aplicações

É uma das espécies mais cultivada como [ornamental](#) em parques e jardins pela sua beleza e resistência à poluição. Possui uma madeira dura, difícil de trabalhar, contudo apreciada para trabalhos de marcenaria. Como planta medicinal, às folhas são atribuídas propriedades diuréticas e os frutos, que são tóxicos, são purgantes e provocam o vômito.

## Folha



## Tronco

