

SERRAVES

Howea forsteriana (F.Muell.) Becc.

5 Exemplos no Parque



Família

Arecaceae

Nome Comum

palmeira-kentia, quência, kentia, palmeira-do paraíso, palmeira-de-interiores

Origem

Endêmica da Ilha Lord Howe (Oceânia)

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

(F.Muell.) Becc.

Descrição

O espique da palmeira-kentia pode atingir 20 metros de altura, sendo mais dilatado na base e possuindo anéis bem marcados, que são cicatrizes resultantes da queda das folhas. As folhas são pinadas, podem atingir cerca de 3 metros de comprimentos, com longos folíolos lineares e pendentes, [verde-escuros](#) na [página](#) superior e [verde](#) mais claro na [página](#) inferior.

As inflorescências são panículas com cerca de 1 metro de comprimento. As flores são brancas dispostas em tríades (2 masculinas e 1 feminina). Possuem numerosos estames. Os frutos são drupas, elipsoides, com cerca de 1,5 (4) cm de comprimento, inicialmente verdes a alaranjados e gradualmente adquirem a cor vermelho-escuro quando maduros.

Tipo de Reprodução

[hermafrodita](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

abril

Fim de Floração

agosto

Tipo de Fruto

[drupa](#)

Consistência do Fruto

[camudo](#)

Perenidade

perenifólia

Inflorescência

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

Cor da Flor

branco

Tipo de Folha

composta

(Folhas formadas por vários limbos parciais (os folíolos) separados entre si.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

inteira

(com a margem não recortada.)

Limbo da Folha

pinulado

(folha composta, com os folíolos articulados ao longo de um eixo comum ou ráquis.)

Habitat

Cresce em clima subtropical, em colónias extensas abaixo dos 875 metros de altitude.

Observações

Embora endémica da Ilha de Lord Howe, a palmeira-kentia tornou-se cosmopolita, por ser muito tolerante a diversos climas, adaptando-se também a interiores com pouca luminosidade. A sua manutenção não requer grandes cuidados e o seu crescimento é bastante lento o que favorece a sua aptidão como planta de interiores. É resistente à salinidade das zonas litorais, mas deve ser protegida dos ventos fortes que podem danificar as suas folhas. Multiplica-se por sementes que devem ser colhidas de frutos totalmente maduros, o que pode levar 3 a 4 anos, e plantados imediatamente. A germinação é muito [irregular](#) e pode levar 2 meses a 3 anos a ocorrer. A quebra da dormência em água quente melhora as taxas de germinação.

Aplicações

A palmeira-kentia é muito utilizada como [ornamental](#), valorizando projetos paisagísticos e de decoração. É uma das palmeiras mais utilizadas em interiores.

Porte



Folha



Tronco

