

# SERRAVES

---

*Howea forsteriana* (F.Muell.) Becc.

## 5 Exemplos no Parque



**Família**

Areaceae

**Nome Comum**

palmeira-kentia, quência, kentia, palmeira-do paraíso, palmeira-de-interiores

**Origem**

Endêmica da Ilha Lord Howe (Oceânia)

**Tipo de Origem**

[alóctone](#)

**Autor**

(F.Muell.) Becc.

**Descrição**

O espique da palmeira-kentia pode atingir 20 metros de altura, sendo mais dilatado na base e possuindo anéis bem marcados, que são cicatrizes resultantes da queda das folhas. As folhas são pinadas, podem atingir cerca de 3 metros de comprimentos, com longos folíolos lineares e pendentes, [verde-escuros](#) na [página](#) superior e [verde](#) mais claro na [página](#) inferior.

As inflorescências são panículas com cerca de 1 metro de comprimento. As flores são brancas dispostas em tríades (2 masculinas e 1 feminina). Possuem numerosos estames. Os frutos são drupas, elipsoides, com cerca de 1,5 (4) cm de comprimento, inicialmente verdes a alaranjados e gradualmente adquirem a cor vermelho-escuro quando maduros.

**Tipo de Reprodução**

[hermafrodita](#)

**Forma de Vida**

[arbusto](#)

**Início de Floração**

abril

**Fim de Floração**

agosto

**Tipo de Fruto**

[drupa](#)

**Consistência do Fruto**

[camudo](#)

## **Perenidade**

perenifólia

## **Inflorescência**

panícula

(inflorescência composta racemosa, de forma geralmente cónica ou piramidal, isto é, mais larga na base.)

## **Cor da Flor**

branco

## **Tipo de Folha**

composta

(Folhas formadas por vários limbos parciais (os folíolos) separados entre si.)

## **Inserção de Folha**

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

## **Margem da Folha**

inteira

(com a margem não recortada.)

## **Limbo da Folha**

pinulado

(folha composta, com os folíolos articulados ao longo de um eixo comum ou ráquis.)

## **Habitat**

Cresce em clima subtropical, em colónias extensas abaixo dos 875 metros de altitude.

## **Observações**

Embora endémica da Ilha de Lord Howe, a palmeira-kentia tornou-se cosmopolita, por ser muito tolerante a diversos climas, adaptando-se também a interiores com pouca luminosidade. A sua manutenção não requer grandes cuidados e o seu crescimento é bastante lento o que favorece a sua aptidão como planta de interiores. É resistente à salinidade das zonas litorais, mas deve ser protegida dos ventos fortes que podem danificar as suas folhas. Multiplica-se por sementes que devem ser colhidas de frutos totalmente maduros, o que pode levar 3 a 4 anos, e plantados imediatamente. A germinação é muito [irregular](#) e pode levar 2 meses a 3 anos a ocorrer. A quebra da dormência em água quente melhora as taxas de germinação.

## Aplicações

A palmeira-kentia é muito utilizada como [ornamental](#), valorizando projetos paisagísticos e de decoração. É uma das palmeiras mais utilizadas em interiores.

## Porte



**Folha**



## Tronco

