

# SERRAVES

---

*Camellia cuspidata* (Kochs) Bean var. *grandiflora*

**0 Exemplos no Parque**



**Família**

Theaceae

## Nome Comum

camélia

## Origem

Sudeste da China (Guangdong, Guangxi, Hunan, Jiangxi)

## Tipo de Origem

[alóctone](#)

## Autor

(Kochs) Bean

## Descrição

A *C. cuspidata* var. *grandiflora* pode atingir 1 a 5 metros de altura, podendo apresentar [porte arbustivo](#) ou [arbóreo](#) consoante o seu grau de crescimento. Os ramos mais jovens são desprovidos de [pelos](#) ou minuciosamente pubescentes, exibindo uma cor castanho-amarelada a castanho-acinzentada.

As folhas, de 5 a 11 cm de comprimento, exibem textura coriácea, semelhante ao couro, são [oblongo-elípticas](#), [oblongo-lanceoladas](#) ou elípticas e as margens são serrilhadas. O [ápice](#) da [folha](#) tende a ser caudado e a base da [folha](#) é amplamente cuneada. Ambas as faces [da folha](#) são glabras, isto é, desprovidas de [pelos](#), apresentando um ligeiro [indumento](#) de [pelos](#) na [nervura](#) central.

As flores, até 3 cm de diâmetro, surgem solitárias ou agrupadas e são axilares ou subterminais. Possuem 5 sépalas, amplamente ovadas, e 5 a 7 pétalas, de cor branca, largamente obovadas, com o [ápice truncado](#).

O fruto é uma pequena [cápsula](#) globosa, até 2 cm de diâmetro, que contém uma única [semente](#) por lóculo, de cor acastanhada.

## Forma de Vida

[arbusto](#)

## Ínicio de Floração

dezembro

## Fim de Floração

abril

## Tipo de Fruto

[cápsula](#)

**Consistência do Fruto**

seco

**Maturação do Fruto**

agosto

**Perenidade**

perenifólia

**Cor da Flor**

branco

**Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

**Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

**Margem da Folha**

serrilhada

(serrado, com dentes muito pequenos.)

**Limbo da Folha**

oblongo-lanceolado

(limbo largamente lanceolado.)

**Habitat**

Habita preferencialmente em florestas e [matagais](#), entre os 700 e os 1100 metros de altitude.