

SERRAVES

Salix atrocinerea Brot.

5 Exemplos no Parque



Família

Salicaceae

Nome Comum

borrazeira, borrazeira-preta, cinzeiro, salgueiro-preto, cinzeiro, salgueiro, salgueiro-cinzento, vimeiro-preto

Origem

Europa Atlântica e oeste da região Mediterrânica. Frequente por toda a Península Ibérica.

Tipo de Origem

[autóctone](#)

Autor

Brot.

Descrição

[Arbusto](#) ou pequena [árvore](#) que pode atingir 10 m de altura, Com ramos direitos e alargados, nodosos, os jovens com pêlos. [Casca](#) cinzenta e lisa, tornando-se fendida e castanha. Folhas lanceoladas ou [oblongo-lanceoladas](#), muito verdes na [página](#) superior e [glauco-tomentosas](#) na inferior, com 7 a 13 pares de nervuras laterais. [Inflorescência](#) em amentilhos centrípetos (flores abrem a partir da base para o [ápice](#)), subsésseis; aparecem antes das folhas, flores masculinas com estames livres e filetes peludos até ao meio, as femininas com [pistilo tomentoso](#) e [estilete](#) curto. O fruto é uma [cápsula](#) tomentosa, [ovado-cónica](#).

Tipo de Reprodução

[dióica](#)

Forma de Vida

[arbusto](#)

Início de Floração

fevereiro

Fim de Floração

março

Tipo de Fruto

[cápsula](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

março

Perenidade

caducifólia

Inflorescência

amentilho

((ou amento) inflorescência em forma de espiga, geralmente pendente e formada por flores unissexuadas e nuas, ou com o perianto sepalóide, que se destaca pela base do eixo.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

Margem da Folha

denticulada

(que tem dentes muito pequenos ou dentículos.)

Limbo da Folha

oblongo-lanceolado

(limbo largamente lanceolado.)

Habitat

Locais húmidos e alagadiços, frequentemente ao longo das margens de rios e ribeiras ([espécie ripícola](#)).

Observações

Salix atrocinerea é a [espécie](#) do género mais variável, devido ao cruzamento com outros salgueiros, dificultando o seu reconhecimento. Uma das suas formas mais características é o *Salix atrocinerea* subsp. *catalaunica*, repartida na metade oriental da Península, de folhas arredondadas na base (não em forma de cunha como é normal), com [pecíolo](#) muito curto e [pistilo](#) com [estilete](#) muito reduzido, quase nulo.

Aplicações

Os médicos da antiguidade recorriam frequentemente aos salgueiros, sem contudo precisar quais as espécies utilizadas; com efeito, todos os salgueiros de folhas estreitas tinham propriedades medicinais idênticas. Mattioli registou, no séc. XVI, a eficácia das folhas de salgueiro contra as insónias; no séc. XVII, a sua [casca](#) era utilizada como febrífuga (combate a febre e evita o seu aumento). Sabe-se actualmente que este efeito se deve à sua riqueza em ácido salicílico (um seu derivado é um dos medicamentos mais utilizados no Mundo, a aspirina).

Folha



Flor



Fruto



Tronco

