

# SERRAVES

---

*Salix atrocinerea* Brot.

## 5 Exemplos no Parque



**Família**

Salicaceae

## Nome Comum

borrazeira, borrazeira-preta, cinzeiro, salgueiro-preto, cinzeiro, salgueiro, salgueiro-cinzento, vimeiro-preto

## Origem

Europa Atlântica e oeste da região Mediterrânica. Frequente por toda a Península Ibérica.

## Tipo de Origem

[autóctone](#)

## Autor

Brot.

## Descrição

[Arbusto](#) ou pequena [árvore](#) que pode atingir 10 m de altura, Com ramos direitos e alargados, nodosos, os jovens com pêlos. [Casca](#) cinzenta e lisa, tornando-se fendida e castanha. Folhas lanceoladas ou [oblongo-lanceoladas](#), muito verdes na [página](#) superior e [glauco-tomentosas](#) na inferior, com 7 a 13 pares de nervuras laterais. [Inflorescência](#) em amentilhos centrípetos (flores abrem a partir da base para o [ápice](#)), subsésseis; aparecem antes das folhas, flores masculinas com estames livres e filetes peludos até ao meio, as femininas com [pistilo tomentoso](#) e [estilete](#) curto. O fruto é uma [cápsula](#) tomentosa, [ovado-cónica](#).

## Tipo de Reprodução

[dióica](#)

## Forma de Vida

[arbusto](#)

## Início de Floração

fevereiro

## Fim de Floração

março

## Tipo de Fruto

[cápsula](#)

## Consistência do Fruto

seco

## **Maturação do Fruto**

março

## **Perenidade**

caducifólia

## **Inflorescência**

amentilho

((ou amento) inflorescência em forma de espiga, geralmente pendente e formada por flores unissexuadas e nuas, ou com o perianto sepalóide, que se destaca pela base do eixo.)

## **Cor da Flor**

verde

## **Tipo de Folha**

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

## **Inserção de Folha**

alterna

(quando existe uma folha em cada nó.)

## **Margem da Folha**

denticulada

(que tem dentes muito pequenos ou dentículos.)

## **Limbo da Folha**

oblongo-lanceolado

(limbo largamente lanceolado.)

## **Habitat**

Locais húmidos e alagadiços, frequentemente ao longo das margens de rios e ribeiras ([espécie ripícola](#)).

## **Observações**

*Salix atrocinerea* é a [espécie](#) do género mais variável, devido ao cruzamento com outros salgueiros, dificultando o seu reconhecimento. Uma das suas formas mais características é o *Salix atrocinerea* subsp. *catalaunica*, repartida na metade oriental da Península, de folhas arredondadas na base (não em forma de cunha como é normal), com [pecíolo](#) muito curto e [pistilo](#) com [estilete](#) muito reduzido, quase nulo.

## Aplicações

Os médicos da antiguidade recorriam frequentemente aos salgueiros, sem contudo precisar quais as espécies utilizadas; com efeito, todos os salgueiros de folhas estreitas tinham propriedades medicinais idênticas. Mattioli registou, no séc. XVI, a eficácia das folhas de salgueiro contra as insónias; no séc. XVII, a sua [casca](#) era utilizada como febrífuga (combate a febre e evita o seu aumento). Sabe-se actualmente que este efeito se deve à sua riqueza em ácido salicílico (um seu derivado é um dos medicamentos mais utilizados no Mundo, a aspirina).

## Folha



**Flor**



**Fruto**



## Tronco

