

SERRAVES

Acer campestre L.

6 Exemplos no Parque



Família

Sapindaceae

Nome Comum

bordo, ácer, ácer-campestre, bordo-comum

Origem

Europa (Dinamarca, Polónia e Bielorrússia), sudoeste da Ásia (Turquia ao Cáucaso) e norte de África (montanhas do Atlas).

Tipo de Origem

[alóctone](#)

Autor

L.

Descrição

O ácer-campestre é uma [árvore](#) caducifólia que pode chegar aos 20 m de altura. As folhas são opostas, longamente pecioladas, algo coriáceas e de cor mais pálida na [página](#) inferior; quando novas possuem muitos [pelos](#), medem geralmente de 3 a 8 cm, cordiformes na base e palmadas, com 5 lobos profundos e obtusos, os exteriores são, por vezes, muito reduzidos, podendo mesmo não existir. As flores estão dispostas em inflorescências pendentes, [corimbosas](#); verdes, com [cálice](#) e [corola](#) bem desenvolvidos. São quase [sempre](#) unissexuais, mas também podem ser poligâmicas. O fruto ([sâmara](#)) é provido de 2 asas membranosas, que se estreitam um pouco na base e acabam por se afastar, formando um ângulo próximo de 180°.

Tipo de Reprodução

[monóica](#)

Forma de Vida

[árvore](#)

Início de Floração

abril

Fim de Floração

maio

Tipo de Fruto

[sâmara](#)

Consistência do Fruto

seco

Maturação do Fruto

setembro

Perenidade

caducifolia

Inflorescência

corimbo

(inflorescência tipo cacho, na qual as flores, devido ao desigual comprimento dos eixos (os inferiores muito mais longos), se situam mais ou menos ao mesmo nível. O corimbo também pode ser simples ou composto.)

Cor da Flor

verde

Tipo de Folha

simples

(Folha em que o limbo constitui uma superfície contínua.)

Inserção de Folha

oposta

(quando existem duas folhas em cada nó.)

Margem da Folha

lobada

(dividida em lobos, isto é, partições que alcançam frequentemente o meio do limbo.)

Limbo da Folha

lobado

(que está dividido em lobos, isto é, partições que não alcançam o meio do limbo.)

Habitat

Isolados nas orlas dos bosques ou formando pequenos bosquetes em zonas de carvalhais, castinçais, sobre solos frescos, sem preferência edáfica.

Observações

Cultiva-se frequentemente como [árvore](#) de sombra e também para formar sebes, pois aguenta muito bem as podas. Muito semelhantes à zelha (*Acer monpessulanum*), sendo frequentemente confundido com este, no entanto as folhas da zelha são mais ásperas e mais pequenas, só com 3 lóbulos de tamanho semelhante, ovados e inteiros e asas do fruto em ângulo [agudo](#) ou paralelo.

Aplicações

A madeira desta [espécie](#) é dura, compacta e amarelada, muito apreciada em carpintaria para móveis. Outrora as suas folhas e brotos, eram utilizados como alimento para o gado.

Porte



Folha



Flor



Fruto



Tronco

